

# Vinter-eg

## Skålfrugtfamilien



**Vinter-eg** (*Quercus petraea*) er ikke så almindelig som stilk-eg. Den vokser især i Midt- og Østjylland og på Bornholm.

**Skudbygningen.** Vinter-eg er et rankt træ med regelmæssig forgrening. Bladene er lappede med kileformet bladbasis, bladstilken er 1-3 cm lang. Det visne løv bliver ofte siddende vinteren over, deraf navnet vinter-eg.

**Egen springer sent ud.** Udspringet varer fra begyndelsen til slutningen af maj, hvor også blomstringen sker. Hanblomsterne er samlet i lange, hængende rakler. Hunblomsterstanden, og dermed frugterne, er næsten uden stilk.



**Barken** på det gamle træ er dybt furet.

**Træet har mange anvendelser.** Dets frugter (agern) blev tidligere brugt som svinefoder. Ved det blev brugt til husbygning og til skibsbygning – der gik 2000 egetræer til et enkelt linieskib. I dag bruges det mest til møbler og parketgulve.

**Mellemformer – krydsninger** mellem vinter-eg og stilk-eg ses ofte, og en sikker bestemmelse af arterne er ofte vanskelig. Vinter-eg adskiller sig på flere punkter fra stilk-eg: Væksten er rank, bladene er stilkede med kileformet basis og uden ombøjede ører, bladene har flere og kortere lapper, og frugterne er ustilkede og mindre.